

“スズメバチ” は早いうちに予防！！

～蜂トラップで巣作りを予防～

“スズメバチ” の巣の撤去依頼が多数きておりますが、ご自身で予防することができます。

“スズメバチ” の巣から誕生する新女王蜂は、1 個あたり 50～800 匹程度と言われ、えりも町内での生息域が年々増加しております。

安全な時期に効果的に捕獲駆除することで、スズメバチ増加を抑制しましょう。

『女王蜂』を効果的に駆除できるのは、4月から6月です。

年間スケジュールは以下のとおりです。

時期	危険度	巣の形状	行 動
4～6 月	中	フラスコ型	女王蜂が単独で巣を作り、卵を産む。
7～9 月	高	ボール型	働き蜂が羽化し、女王蜂と共同で巣を作る。働き蜂の数が徐々に増え、危険度が高まる。
9～11 月	ヤバイ！	ボール型	新女王蜂が生まれ、オス蜂と交尾を行う。働き蜂の攻撃性がピークになる。
12～3 月	低		女王蜂は冬眠する。女王蜂以外のスズメバチは死ぬ。

フラスコ型 5～6月頃



ボール型 7～11月頃



1. 蜂トラップで女王蜂を駆除すれば巣作りできない

スズメバチは、女王蜂のみが越冬して春先に巣作りを始める。ペットボトルでDIYした蜂トラップを仕掛けて駆除すれば、巣作りを予防することが可能です。自宅の周りに巣を作らせないためにぜひ活用してください。

7月以降は逆効果


7月以降になると女王蜂は巣からでなくなり、働き蜂は凶暴化する。蜂トラップを使用すると凶暴な働き蜂をおびき寄せることになってしまい、非常に危険です。4～6月に設置した蜂トラップも、7月になる前に取り外してください。

2. ペットボトルを使ってスズメバチを駆除する方法

ペットボトルを使ったトラップの作り方を紹介します。スズメバチを効率よく駆除するために役立てましょう。

捕獲器の作り方

1. ペットボトル（2ℓ以上のもの）に、下図のように2cm角の四角い穴を4ヶ所あけます。
2. 誘引剤の材料をよく混ぜ合わせます。
3. 「スズメバチ捕獲中」など注意書きのステッカーを貼り、ひもをつけて完成です。



誘引剤の例

- ① ・お酒：300ml
・砂糖：100g
・酢：100ml
- ② ・グレープフルーツジュース 200ml
・お酒：60ml
・砂糖：40g
・酢：40ml

など。誘引剤の組み合わせに絶対はありません。

※スズメバチは、発酵臭によく集まります。

※直射日光の当たらない場所（木陰等）の高さ2mくらいの場所に設置してください。